

ACTIVA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão accidental, NÃO INDUZA O VÓMITO. Procure imediatamente assistência médica.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, consulte o pessoal médico.

Nota para o médico: Não há antídoto disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

TIAMETOXAM 25% WDG

Insecticida sistémico utilizado para o controle de pulgões, cupins, baratas, pulgas, formigas, moscas (larvas e adultas) e cochonilhas em variadas culturas.

GRANULADO DISPERSÍVEL



MANTER FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **IN 110**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos factores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do **ACTIVA** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

ACTIVA deve ser pulverizado uniformemente assegurando a cobertura completa das culturas. A primeira pulverização foliar deve ser feita no estado de larva das pragas ou antes do desenvolvimento dos insectos.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose	Aplicação
Abacaxi	300 g / 100 L	Imersão
	600 ~ 800 g / ha	Esguicho
Alface	200 ~ 300 g / ha	Irrigação
Arroz	100 ~ 150 g / ha	Foliar
Algodão	100 ~ 200 g / ha	Foliar
	50 ~ 60 g / ha	Foliar
Batata	600 ~ 800 g / ha	Jacto
	400 ~ 800 g / ha	Pulverização
Citros	600 g / ha	Jacto
Feijão	100 ~ 200 g / ha	Foliar ou Pivot
Feijão-Vagem	600 g / ha	Esguicho
Maça	2000 g / ha	Esguicho
Mamão	400 ~ 800 g / ha	Esguicho
	12 ~20 g/100 L água	Foliar
Tomate	800 g / ha	Esguicho
	20 g/100 L água	Foliar
Repolho	200 ~ 800 g / ha	Esguicho

INCOMPATIBILIDADE

Incompatível com ácidos, bases e agentes oxidantes fortes.

FITOTOXICIDADE

Não fitotóxico para as culturas quando usado como indicado

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

