

AMETRINWAY

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, provoque o vômito e procure imediatamente o médico.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, consulte o pessoal médico.

Nota para o médico: Não há antídoto disponível para casos de ingestão. Provoque emese ou proceda a lavagem gástrica, administrar laxante salino e terapia de manutenção.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

AMETRINA 50% SC

Herbicida selectivo de acção sistémica.

SUSPENSÃO CONCENTRADA



MANTER FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **HB077**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do **AMETRINWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

AMETRINWAY é um herbicida selectivo com eficiência no controle de plantas daninhas em pré -emergência na cultura da cana-de açúcar. Para o abacaxi recomenda-se a aplicação desde pré a pós-emergência inicial. Para o milho, exclusivamente com a cultura já desenvolvida, em aplicação nas entrelinhas.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

| Cultura | Dose |
|----------------|---------------|
| Cana-de-açúcar | 4 ~ 8 Lt / ha |
| Café | 3 ~ 4 Lt / ha |
| Abacaxi | 4 ~ 6 Lt / ha |
| Milho | 3 ~ 4 Lt / ha |

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Coloque metade da água necessária no pulverizador. Juntar a quantidade do produto a utilizar. Encha então o pulverizador com água mantendo a agitação. Na aplicação, o volume de calda utilizado por hectare é de 200 litros.

MODO DE APLICAÇÃO:

Aplicação através de pulverização com equipamentos costais ou tratorizados. No caso específico da cana-de-açúcar, o tratamento pode ser realizado também com aeronaves.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO:

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

