

CIPERWAY

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure imediatamente assistência médica.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, consulte o pessoal médico.

Nota para o médico: Não há antídoto específico disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

CIPERMETRINA 20% EC

Insecticida piretróide que age por contacto e ingestão.

CONCENTRADO EMULSIONÁVEL



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº:

ESTABILIDADE: A qualidade do CIPERWAY é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

CIPERWAY é um insecticida piretróide que age por contacto e ingestão para o controlo de insectos / pragas nas culturas do algodão, arroz, café, cebola, milho, soja e tomate.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose (Produto Comercial)	Volume de Calda	Intervalo de Segurança (Dias)
Algodão	50 ~ 300 ml / ha	100 ~ 500 L/ha	20
Arroz	50 ~ 75 ml / ha	100 ~ 500 L/ha	10
Arroz Irrigado	50 ~ 75 ml / ha	100 ~ 500 L/ha	10
Café	50 ~ 70 ml / 1000 plantas	100 ~ 500 L/ha	30
Cebola	20 ~ 30 ml / 100 L d'água	100 ~ 500 L/ha	5
Milho	50 ~ 80 ml / ha	100 ~ 500 L/ha	30
Soja	75 ~ 250 ml / ha	100 ~ 500 L/ha	30
Tomate	16 ~ 30 ml / 100 L d'água	100 ~ 500 L/ha	10

MODO DE APLICAÇÃO

A aplicação poderá ser efectuada com pulverizadores costais, tratorizados e aeronaves agrícolas.

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO

O número de aplicações varia de acordo com a infestação da praga. O produto deve ser aplicado logo após o início da infestação. Efectuar a aplicação de forma que possibilite uma boa cobertura da parte aérea das plantas.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

