

CLATONIL

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não armazene junto com alimentos, bebidas ou outros materiais.

PRIMEIROS SOCORROS

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave com água e sabão em abundância e se houver sinais de irritação procure ajuda médica.

Ingestão: Se a pessoa estiver completamente consciente, dê água e provoque vômito. Procure ajuda médica imediatamente levando o rótulo, bula ou a embalagem do produto. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Remova a pessoa para um local arejado. Se os sintomas persistirem procure ajuda médica levando o rótulo, bula ou a embalagem do produto.

Nota para o médico: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático. Nos casos de irritação dérmica, é recomendada aplicação tópica de creme esteróide.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

CLOROTALONIL 50% SC

Fungicida de contacto do grupo químico da Isoftalonitrila indicado para o controlo de diversas doenças.

Suspensão Concentrada



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº:

ESTABILIDADE: A qualidade do **CLATONIL** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

Cultura	Dose (Produto Comercial)	Época de Aplicação
Amendoim	2,5 ~ 3,5 L/ha	Iniciar aplicações logo aos primeiros sintomas e repetir a cada 7 a 10 dias.
Arroz	2,5 ~ 3,0 L/ha	Efectuar 3 aplicações: 1ª no início do emborrachamento, a 2ª na emissão das panículas e a 3ª no florescimento.
Banana	1,0 ~ 2,0 L/ha ou 400 ml/100 L d'água com 250-500 L calda/ha	Iniciar aplicações em Novembro, logo que surgirem as doenças. Repetir a cada 15 dias até final de Maio ou início de Junho.
Batata	2,5 ~ 3,5 L/ha ou 400 ml / 100 L d'água com 600-900 L calda/ha	Iniciar aplicações logo aos primeiros sintomas das doenças e repetir a cada 7 a 10 dias.
Beringela	400 ml / 100 L d'água com 600-900 L calda/ha	Iniciar as aplicações logo aos primeiros sintomas das doenças e repetir a cada 7 a 10 dias.
Cenoura	400 ml / 100 L d'água com 600-900 L calda/ha	
Citros	300 ml / 100 L d'água com 4-10 L calda/planta	Efectuar 2 aplicações 1ª quando 2/3 das pétalas caírem, 2ª no início da frutificação (frutos com 0,3 ~ 0,5 de Q)
Feijão	2,5 ~ 3,0 L/ha	Iniciar as aplicações 30 dias após plantio e repetir cada 10 a 15 dias.
Melão	400 ml / 100 L d'água com 600-900 L calda/ha	Iniciar as aplicações logo aos primeiros sintomas das doenças e repetir a cada 7 a 10 dias.
Melancia		
Pepino		
Pimento		
Soja	2,0 ~ 3,0 L/ha	Efectuar 2 aplicações 1ª no florescimento e a 2ª depois de 15 a 20 dias.
Tomate	400 ml / 100 L d'água com 600-900 L calda/ha	Iniciar uma semana após a emergência e repetir a cada 7 dias.
Uva	400 ml / 100 L d'água com 2 - 3 L calda/planta	Começar as aplicações no início da brotação. Repetir o tratamento a cada 7 dias até ao florescimento.

