

CUPRAWAY

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não aplicar contra o vento ou enquanto chove. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não armazene junto com comidas, sementes, fertilizantes, insecticidas e fungicidas. Tóxico aos animais, peixes e abelhas.

PRIMEIROS SOCORROS

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure assistência médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Remova a vítima para local arejado e procure assistência médica.

Nota para o médico: Não há antídoto específico disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

OXICLORETO DE COBRE 50% WP

Fungicida de contacto do grupo químico inorgânico.

Pó Molhável



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **FG 038**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

ESTABILIDADE: A qualidade do **CUPRAWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

CUPRAWAY é um fungicida cúprico, com acção bacteriostática, na forma de grânulos dispersíveis, com acção preventiva e de contacto, contra fungos causadores das doenças nas culturas de batata, tomate, citros, café entre outros. Corrosivo ao ferro e outros metais.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose
Abóbora, Abobrinha, Abacate	250 g / 100 L água
Alho	250 g / 100 L água
Alface, Aipo, Espinafre	250 g / 100 L água
Amendoim	2,0 ~ 2,5 Kg / ha
Banana	250 g / 100 L água
Batata	250 ~ 350 g / 100 L água
Beringela, Beterraba	250 g / 100 L água
Couve-flor, Repolho, Brócolos, Nabo, Agrião e Rabanete	250 g / 100 L água
Café	3,0 Kg / ha
Citros	150 ~ 200 g / 100 L água
Cebola	250 g / 100 L água
Cenoura	250 g / 100 L água
Feijão	2,0 ~ 3,0 Kg / há
Goiaba	300 g / 100 L água
Mamão, Manga, Maracujá	250 g / 100 L água
Melão, Melancia, Pepino	250 g / 100 L água
Ornamentais (Flores, Arbustos)	300 g / 100 L água
Pimento, Gindungo e Kaombo	250 g / 100 L água
Tomate	250 ~ 350 g / 100 L água
Uva	250 g / 100 L água

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

O produto deve ser diluído em água limpa e aplicado na forma de pulverização sobre as plantas, nas dosagens recomendadas.

