

# GRAMATO

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

## PRIMEIROS SOCORROS

**Contacto com os olhos:** Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

**Contacto com a pele:** Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água e sabão em abundância.

**Ingestão:** transporte rapidamente a pessoa para o serviço médico de emergência, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. Esta formulação contém um agente emético, portanto não controle vômito em pessoas recém-intoxicadas por ingestão até que o líquido vomitado se torne claro e transparente, mas evite que o acidentado respire o produto vomitado, deitando-o de lado, com a boca aberta. O corante e odorizante devem evitar que haja ingestão acidental do produto.

**Inalação:** Remova a vítima para local arejado. Se inconsciente e não respirar praticar respiração artificial ou oxigenação.

**Nota para o médico:** Não há antídoto específico disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

PARAQUATO 20% SL

Herbicida não selectivo com acção de contacto.

Concentrado Solúvel



**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Nº do lote:  
Data de Fabrico:  
Registo nº: **HB 067**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54  
Luanda - Angola

## Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos factores que escapam ao nosso controlo.

**ESTABILIDADE:** A qualidade do **GLYPHOWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

**ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS**

## INSTRUÇÕES DE USO

**GRAMATO** é um herbicida não selectivo, com acção de contacto, utilizado em pulverização com jacto dirigido ou em área total antes do plantio directo, para o controle em pós-emergência de plantas infestantes, nas culturas de algodão, arroz, batata, banana, café, cana-de-açúcar, citros, feijão, milho, soja e uva. É também utilizado em dessecação das culturas de algodão, arroz, batata, cana-de-açúcar, milho e soja.

## DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dosagem	Volume de calda
Algodão	1,5 ~ 3,0 L / ha	250 L / ha
Arroz	1,5 ~ 3,0 L / ha	
Banana	1,5 ~ 3,0 L / ha	
Batata	1,5 ~ 3,0 L / ha	
Café	1,5 ~ 3,0 L / ha	
Cana-de-açúcar	1,5 ~ 3,0 L / ha	
Citros	1,5 ~ 3,0 L / ha	
Feijão	1,5 ~ 3,0 L / ha	
Milho	1,5 ~ 3,0 L / ha	
Soja	1,5 ~ 3,0 L / ha	

## MODO DE APLICAÇÃO

**GRAMATO** deve ser aplicado com pulverizadores costais manuais ou tratorizados. O herbicida **GRAMATO** pode ser utilizado em pulverizações com jacto dirigido ou em área total antes do plantio directo, para o controle de plantas infestantes.

Obs.: Batata e Cana-de-açúcar: para o uso em sistema de cultivo plantio directo, o produto deve ser aplicado em pós-emergência das plantas infestantes, 30 dias antes do plantio da cultura.

Em dessecação de culturas, o volume de calda para as culturas de algodão, arroz, batata, milho e soja: 250 L/ha; para a cultura da cana-de-açúcar: 40 L/ha.

## ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar com comidas ou outros produtos agroquímicos. Guardar no recipiente próprio fechado à chave, em embalagens originais numa área fresca e seca com boa ventilação. Evitar uma temperatura elevada acima de 40°C. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local concernente ou entregues aos aterros autorizados.



