

PENDILINA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não aplicar contra o vento ou enquanto chove. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios.

PRIMEIROS SOCORROS

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure assistência médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Remova a vítima para local arejado e procure assistência médica.

Nota para o médico: Não há antídoto específico disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

PENDIMENTALINA 33% EC

Herbicida selectivo com acção residual para o combate a infestantes mono e dicotiledóneas.

Concentrado Emulsionável



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº:

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixado à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade da **PENDILINA** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

A **PENDILINA** é um herbicida residual com larga persistência de acção que pode atingir os 3 a 4 meses e deve ser sempre aplicado antes da emergência das infestantes. Dado o seu modo de acção, aliado à longa persistência de acção, a **PENDILINA** permite manter as culturas livres da concorrência das infestantes durante parte do seu ciclo vegetativo. A **PENDILINA** apresenta uma excelente selectividade para diversas culturas em pré-emergência ou pré-transplante (no caso da cebola pode inclusivamente ser aplicado em pós-transplante).

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose	Época de Aplicação
Batata	4,0 L / ha	Pré-emergência da cultura
Cebola transplantada	4,0 L / ha	Após 2-3 dias do plantio
Cenoura	4,0 L / ha	Pré-emergência da cultura
Ervilha	4,0 L / ha	Pré-emergência da cultura
Feijão e Feijão-verde	4,0 L / ha	Pré-emergência da cultura
Girassol	4,0 ~ 5,0 L / ha	Pré-emergência da cultura
Alho	4,0 ~ 6,0 L / ha	Pré-emergência da cultura
Couves: Lombarda, Portuguesa e Repolho	4,0 ~ 6,0 L / ha	Pré-plantio da cultura
Tomate Transplantado	4,0 ~ 6,0 L / ha	Pré-plantio da cultura
Milho	4,0 L / ha	Pré ou pós-emergência da cultura
Pimento	4,0 ~ 6,0 L / ha	Pré-plantio da cultura
Citrinos	4,0 ~ 6,0 L / ha	Aplicar no período desde o final da colheita até ao vingamento dos frutos. Não atingir ramos e folhas.
Soja	4,0 ~ 6,0 L / ha	Pré-plantio da cultura

A dose de aplicação recomendada é de 4 a 6 L / ha. As doses mais baixas destinam-se a solos ligeiros e as mais altas a solos pesados e/ou ricos em matéria orgânica. Volume de calda: 300 a 600 L / ha.

O solo deve estar bem bem mobilizado, sem torrões e com suficiente humidade na altura da aplicação. Aplicar a **PENDILINA** antes da emergência das infestantes, distribuindo uniformemente a dose recomendada.

Excelente eficácia contra infestantes anuais, gramíneas e de folha larga.

