

PROFITINA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não armazene junto com comidas, sementes, fertilizantes, insecticidas e fungicidas. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure imediatamente assistência médica.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, consulte o pessoal médico.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

PROFENOFÓS 40% +
CIPERMETRINA 4% EC

Insecticida acaricida com acção de contacto, ingestão e profundidade.

CONCENTRADO EMULSIONÁVEL



MANTER FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **IN 130**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do **PROFITINA** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

PROFITINA é um insecticida acaricida composto por um insecticida acaricida organofosforado e um insecticida piretroide, com acção de contacto, ingestão e profundidade, indicado para o controle de pragas nas culturas abaixo indicadas.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose	Volume de Calda
Algodão	0,15 ~ 1 L / ha	80 ~ 200 L / ha
Amendoim	0,25 ~ 0,30 L / ha	80 ~ 200 L / ha
Batata	0,4 ~ 1,25 L / ha	250 ~ 800 L / ha
Café	150 ml / 100 L de água	300 ~ 400 L / ha
Cebola	0,4 ~ 0,5 L / ha	600 ~ 800 L / ha
Ervilha	0,125 L / ha	600 L / ha
Feijão	0,3 ~ 0,8 L / ha	100 ~ 150 L / ha
Melancia	100 ml / 100 L de água	600 L / ha
Milho	0,25 ~ 0,40 L / ha	200 ~ 400 L / ha
Pepino	40 ~ 80 ml / 100 L de água	450 ~ 900 L / ha
Repolho	100 ml / 100 L de água	600 L / ha
Soja	0,10 ~ 0,12 L / ha	80 ~ 200 L / ha
Tomate	75 ~ 125 ml / 100 L de água	500 ~ 1000 L / ha
Feijão-Vagem	125 ml / 100 L de água	800 L / ha

NOTA:

Os volumes de calda acima deverão ser ajustados de acordo com o porte e cobertura foliar da planta, evitando-se perda por escorrimento. Empregar os menores valores para os estádios iniciais, aumentando-se o volume conforme o estágio de desenvolvimento da cultura, de modo a garantir que será sempre aplicada a quantidade de princípio activo recomendada nas instruções de uso.

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Deve-se colocar a dose recomendada do produto no tanque de pulverização contendo ¼ da capacidade de água. Em seguida completar com o volume pretendido mantendo a agitação constante.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

