

REGENTWAY

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure imediatamente assistência médica.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, consulte o pessoal médico.

Nota para o médico: Não há antídoto disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

FIPRONIL 20% SC

Insecticida de contacto e ingestão de amplo espectro do grupo pirazol.

SUSPENSÃO CONCENTRADA



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **IN 113**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

ESTABILIDADE: A qualidade do **REGENTWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos factores que escapam ao nosso controlo.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

REGENTWAY é utilizado para controlar tripses numa grande gama de colheitas através do tratamento de folha, solo ou semente; controlo de bicho da raiz, elaterídeos, térmitas através do tratamento do solo no milho; controlo de bicudos-do-algodoeiro e bichos da planta no algodão; borboletas nocturnas nas crucíferas; besouro-da-batata por aplicação nas folhas; controlo de brocas, bicho-mineiro, fulgoromorfos, dobradores/enroladores da folha no arroz; bicudo na cana-de-açúcar.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose
Algodão	20 ~ 375 ml / ha
Arroz	20 ~ 60 ml / ha
Cana-de-açúcar	80 ~ 120 ml / ha
Legumes	75 ~120 ml / ha
Milho	20 ml / ha
Relvados	75 ~155 ml / ha
Soja	20 ~ 150 ml / ha

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Coloque metade da água necessária no tanque do pulverizador. Juntar a quantidade do produto a utilizar. Encha então o pulverizador com água mantendo a agitação.

MODO DE APLICAÇÃO

O **REGENTWAY** pode ser aplicado através de pulverizadores costais ou tratorizados.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

